



**Global
Communities**
Partners for Good



Asociación
KUKULCÁN

**Estudio sobre personas que
usan drogas/Sustancias
Psicoactivas (PUD/SPA) y su
relación con el Virus de
Inmunodeficiencia Humana
(VIH)/ Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS) en
Honduras 2022.**

ESTUDIO SOBRE PERSONAS QUE USAN DROGAS/SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (PUD/SPA) Y SU RELACIÓN CON EL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)/ INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) EN HONDURAS 2022.

En el marco de la subvención “MOVIENDO LAS RESPUESTAS AL VIH Y LA TUBERCULOSIS HACIA EL 90-90-90 Y LA SOSTENIBILIDAD CON ENFOQUE EN POBLACIONES CLAVE Y VULNERABLES, 2019-2022, financiado por el Fondo Mundial” implementada en 3 regiones del país con la mayor carga de VIH y la mayor concentración de población y reporte de violación de derechos humanos en estas poblaciones, en los cuales se ejecutan las actividades propuestas en el Plan Quinquenal de Derechos Humanos.

Como una acción dirigida a la reducción de barreras relacionadas con los derechos humanos en la respuesta nacional al VIH a favor de poblaciones clave y en condición de vulnerabilidad en Honduras se desarrolló el estudio sobre personas usuarias de drogas/ Sustancias Psicoactivas (PUD/SPA) y su relación con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

El desarrollo de esta investigación fue llevada a cabo bajo la responsabilidad de Global Communities y la Asociación Kukulcán.

OBJETIVO


Conocer la realidad que existe entre personas usuarias de drogas/SPA en relación al riesgo de contraer VIH u otras infecciones de Transmisión sexual (ITS) en términos de barreras para el acceso a servicios de salud y violaciones a derechos humanos, en las regiones Atlántico Insular, Norte Occidental y Centro Sur Oriente de Honduras en un periodo de Febrero a Julio 2022.

METODOLOGIA

La metodología utilizada fue mixta de tipo no probabilístico con alcance descriptivo-analítico, se implementó un método de muestreo en cadena, denominado comúnmente como “bola de nieve”.

En el periodo comprendido del 21 de marzo al 21 de mayo 2022, se realizó el levantamiento de 315 encuestas a personas usuarias de drogas/SPA y 45 a prestadores de salud en tres regiones de Honduras (centro-sur-oriente, atlántico-insular, nor-occidente), donde existe la mayor prevalencia de casos de VIH y el mayor registro de violaciones a los derechos humanos en poblaciones clave y vulnerables.

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL



Personas usuarias de drogas/PSA

Se realizaron un total de 315 encuestas en los municipios de La Ceiba (35), Tocoa (35), Trujillo (35), Roatán (35), San Pedro Sula (35), Puerto Cortes (35), Choloma (35), Tegucigalpa (35) y Comayagua (35).

Prestadores de Servicios de Salud


Se realizaron un total de 45 encuestas en los municipios de La Ceiba (5), Tocoa (5), Trujillo (5), Roatán (5), San Pedro Sula (5), Puerto Cortes (5), Choloma (5), Tegucigalpa (5) y Comayagua (5).

RESULTADOS


PERSONAS USUARIAS DE DROGAS/SPA

1. Datos sociodemográficos

En su conjunto el perfil sociodemográfico de las PUD/SPA encuestadas, nos proporciona una idea o nos sitúa dentro de los hallazgos que nos pueden determinar en su mayoría dicho perfil, en el cual se identifica que el 43.81% se sitúan entre un rango de edad de 18-28 años, conformada por un amplia gama de diversidad sexual, identificándose cerca de la mitad como población heterosexual.



Fuente. Base de datos de instrumento estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=315).



Fuente. Base de datos de instrumento estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=315).


El nivel de educación alcanzado se encuentra entre básica a universitaria en un 68.25% y menos de la mitad cuentan con un trabajo formal siendo este su principal fuente de ingreso, por lo que han podido acceder a una vivienda ya sea propia o alquilada.

2. Consumo de sustancias, frecuencia de consumo y prácticas de inyección de riesgo.


El rango de edad de inicio en el consumo de drogas/SPA se ubica en su mayoría en la juventud siendo la frecuencia etaria de 47.94% entre 16-19 años.

Se identifico que dentro del tipo de sustancia que consumen se encuentran dentro de la categoría como legales de libre consumo el tabaco (59.05%) y el alcohol (86.67%); dentro de las ilegales están las de consumo conocido como la marihuana (60.32%), Cocaína (40.95%), crack (41.59%) y las de consumo intravenoso tenemos la heroína (8.89%), morfina (6.67%).


Dentro de las frecuencias de consumo sobresalen las de consumo diario como el tabaco, la marihuana, en la frecuencia de una vez al mes tenemos la morfina y en frecuencia de varias veces al mes están el alcohol, cocaína, crack y la heroína; este patrón llevo a la identificación de la mezcla de dos o más sustancias, lo que refleja un poli consumo en 75.56% de la PUD/SPA; presentando el 25.39% crisis de sobredosis en los últimos 12 meses.



Fuente. Base de datos de instrumento estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=315).



Fuente. Base de datos de instrumento estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=315).




Fuente. Base de datos de instrumento estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=315).


Además, el estudio reflejo las formas preferidas de consumo siendo la de mayor preferencia la fumada (77.46%), intranasal/inhalada (43.49%) e intravenosa (19.09%).



Se identificó a 60 PUD/SPA que consumen drogas intravenosas, se encuentran mujeres/hombres heterosexuales, personas no binarias, hombres gay, mujeres/hombres trans y mujeres/hombres trabajadores sexuales, que en los últimos 12 meses se han inyectado 5 veces o menos; la mayoría (73.3%) obtiene la jeringa/aguja en establecimientos como farmacia y el hospital, en los últimos 30 días el 10% reutilizó la jeringa/aguja y el 6.67% la compartió, y menos de la mitad tiene la buena costumbre de desinfectarla.



Fuente. Base de datos de la encuesta estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=60).




Fuente. Base de datos de la encuesta estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=60).


3. Comportamientos de riesgo y relación al VIH e ITS

El estudio reportó que el 72% de las personas usuarias de sustancias, tienen relaciones sexuales bajo los efectos de drogas/SPA, identificando que el 44% no usa condón;


En relación a la infección de VIH, el 11.43% tienen un diagnóstico positivo, la mayoría tienen un tiempo de conocer su condición entre 5 a 10 años; es importante mencionar que el 14% tienen el hábito de compartir la jeringa/aguja, siendo esta práctica una vía por la cual adquirieron la infección de VIH (11%), también refieren las relaciones sexuales (77.7%) como otra vía de infección.



Fuente. Base de datos de instrumento estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=315).



Fuente. Base de datos de la encuesta estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=315).




Fuente. Base de datos de la encuesta estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=36).

Las personas usuarias de drogas/SPA con VIH, el 14.29% si comparte su jeringa y un 85.71% no comparte.

En relación a otras infecciones de transmisión sexual, el 48.7% refirieron haber presentado algún tipo de ITS, teniendo al menos un episodio (25%) en los últimos 12 meses, entre las cuales figuran el virus de papiloma humano (11.7%), sífilis (10.9%), gonorrea (10%), entre otras.


4. Servicios de Salud y Barreras de acceso

Otro de los hallazgos que el estudio incluyó fue el acceso a los servicios de salud y las barreras que las PUD/SPA perciben al momento de recibir la atención, se logró identificar del total que han sido diagnosticado o presentado sintomatología de infecciones de transmisión sexual, el 88.8% de los diagnosticados con VIH han acudido a recibir atención médica.




Fuente. Base de datos de la encuesta estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=36).

Entre estas personas con diagnóstico de VIH, el 11.11% posiblemente se infectó por compartir jeringas.




Fuente. Base de datos de la encuesta estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=315).



Fuente. Base de datos de la encuesta estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=PVIH: 36) (N=ITS:152)

Las PVIH refirieron en su mayoría haber recibido atención médica con estigma y discriminación (75%), en cuanto a los que presentaron otras ITS, el 92% ha buscado la atención médica, experimentando estigma y discriminación (27.8%) por parte del servicio de salud.




Fuente. Base de datos de la encuesta estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=PVIH: 32) (N=ITS: (140)).

5. Violencia, estigma y discriminación a PUD/SPA

En este estudio, además de los riesgos directos al consumo de drogas/SPA, se presentan otros riesgos y consecuencias como violencia, estigma y discriminación que enfrentan las personas usuarias, debido al enfoque punitivo que criminaliza el uso de sustancias.

Se identificó que por parte de autoridades, las personas usuarias de drogas han percibido acoso/agresión (19%), soborno y violencia (18%), privación de libertad por consumo (19%), maltrato y violencia (54%).



Fuente. Base de datos de la encuesta estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=315).





Fuente. Base de datos de la encuesta estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=315).



Fuente. Base de datos de la encuesta estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=315).



Fuente. Base de datos de la encuesta estudio sobre personas que usan drogas/SPA y su relación con VIH e ITS, 2022 en Honduras (N=315).

PRESTADORES DE SALUD

Se presentan los hallazgos en relación a:

- Uso o existencia de protocolos de atención o formularios para intervenir a las personas usuarias de drogas/SPA.
- Lineamientos de atención a PUD/SPA, abordajes y servicios para la reducción de riesgos y daños a las PUD/SPA relacionado con VIH/ITS.
- Necesidades para la mejora de la atención a las PUD/SPA en relación con VIH/ITS y las repercusiones de consumo de drogas/SPA en personas que demandan servicios de atención en salud en relación al VIH/ITS.

RESULTADOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD

A. Protocolos de atención o formularios para intervenir a las personas usuarias de drogas/SPA.

La mayoría de prestadores de servicios de salud reportan no tener protocolos específicos para la intervención oportuna al identificar a PUD/SPA que demandan atención en relación al VIH/ITS, cuentan con formularios oficiales de la SESAL de Honduras denominado "Ficha de notificación de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)" el cual identifica el uso de drogas ilícitas inyectables en los últimos 12 meses; la "Historia clínica de ITS para mujeres y hombres que distingue los antecedentes de consumo de alcohol y otras drogas/SPA (Diazepam, Éxtasis, Tinner, Pegamento, Cocaína, Marihuana, Heroína) de forma oral o inyectada.



B. Lineamientos de atención a personas usuarias de drogas/SPA

Al no existir protocolos de atención dirigidos a personas usuarias de drogas/SPA en relación a VIH/ITS, el personal de salud identifica procedimientos para la atención, como lineamientos desde un enfoque dirigido a la rehabilitación basada en abstinencia y atención psicológica, estos varían de acuerdo al conocimiento, antigüedad laboral y al personal con el que cuentan los centros de salud.

C. Abordajes y servicios para la reducción de riesgos y daños a las personas usuarias de drogas/SPA relacionado con VIH/ITS.

Los prestadores de servicio de salud, cuando identifican a un usuario de drogas/SPA que acuden por un servicio de atención en salud, brindan información básica, de manera informal y el servicio generalmente está orientado a las reacciones prohibicionistas, que conllevan al consumo de sustancias y no sobresalen de charlas y consejerías sobre los daños y consecuencia del uso de drogas/SPA; los abordajes no están dirigidos hacia la reducción de daños, con un enfoque de derechos donde el usuario de sustancias conozca las formas de contrarrestar el impacto del consumo; en la relación de uso de drogas/SPA con la infección por VIH e ITS, se brindan servicios referentes al cuidado en el uso de drogas/SPA y relaciones sexuales, así como el compartimiento de jeringas para evitar infecciones.

D. Necesidades para la mejora de la atención a las PUD/SPA en relación con VIH/ITS.

Una de las necesidades identificadas por el personal de salud, que atienden a personas usuarias de drogas/SPA que buscan los servicios en atención de VIH/ITS, es contar con protocolos y manuales de intervención aprobados por la Secretaría de Salud de Honduras, para implementar estrategias e intervenciones homologadas en todos los centros de atención en salud; La necesidad de personal de salud capacitado es evidente para el abordaje adecuado hacia las personas usuarias de drogas/SPA que buscan los servicios de atención en VIH/ITS, ya que no tienen conocimiento de cómo intervenir esta población desde un enfoque de reducción de daños y de la no prohibición del uso de las drogas/SPA.

E. Repercusiones del consumo de drogas/SPA en personas que demandan servicios de atención en salud en relación al VIH/ITS.

El personal que brinda servicios de salud a personas usuarias de drogas/SPA, en busca de una atención por VIH coinciden que, la principal repercusión del consumo de sustancias es, la falta de adherencia al tratamiento, ya que hay interrupción y abandono, desapego a la terapia y no realización de sus exámenes periódicos para dar seguimiento a la infección por VIH.

Los comportamientos sexuales bajo los efectos de drogas/SPA, dejan expuestas a las personas usuarias de sustancias a contraer una/varias infecciones o reinfecciones por ITS y no contribuyen a implementar herramientas de prevención.

CONCLUSIONES

- Con esta investigación se profundizó en el estudio de la población usuaria de drogas (PUD) y sustancias psicoactivas (SPA) legales e ilegales y nos permitió comprobar que si aumenta el riesgo de adquirir la infección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual con el consumo drogas/SPA.
- El uso de drogas o sustancias psicoactivas está presente como factor determinante en diversas poblaciones en condición de vulnerabilidad, las PUD se ubican en una edad adulta joven y en su mayoría iniciaron su consumo en la adolescencia entre los 16 a 19 años, alcanzan un nivel de educación básica, son una población económicamente activa, pero menos de la mitad cuentan con un trabajo formal.
- En el patrón de consumo se identificaron 12 tipos de sustancias y 4 formas de consumo para drogas/SPA, dentro de las cuales solo el alcohol y el tabaco poseen una normativa legal, la mayoría se agrupa como ilegales o prohibidas y pocas con una regulación de uso controlado. Las sustancias que presentan un mayor consumo son el alcohol, tabaco (legal), la marihuana (ilegal), estas dos últimas con mayor frecuencia de consumo diario y que incluyen conductas de policonsumo.
- Dentro del patrón de consumo intravenoso, se identificó el uso de sustancias como morfina, heroína y fentanilo con una frecuencia de una o varias veces al mes, presentan comportamientos de riesgo para adquirir VIH e ITS, como el hecho de reutilizar la jeringa, compartirla con otras personas usuarias y no usar jeringas nuevas o previamente desinfectadas.
- Referente a conductas de riesgo se encontró personas que tienen relaciones sexuales bajo efectos de drogas/SPA y que no utilizaron el condón; además se identificaron personas diagnosticadas con VIH que consideraron que la forma posible de infección fue a través de relaciones sexuales y otras por compartir jeringas. También se determinó la prevalencia de al menos una ITS en los últimos 12 meses, identificándose entre las más comunes la sífilis, la gonorrea, candidiasis, el VPH, el VHC, el VHB y la clamidia.
- Tanto personas usuarias de drogas/SPA con VIH como personas con ITS indican haber sido estigmatizadas y discriminadas por su condición. Entre los motivos por los cuales no acuden a servicios de atención, prevención o tratamiento en VIH/ITS sobresale que el personal de salud no les genera confianza, que el centro de atención en salud está muy lejos y el hecho de ser discriminadas por su condición de PUD, LGTBI y MTS entre otros.
- Se identificó a personas usuarias de drogas/SPA que han sufrido acoso o agresión por personas y autoridades, así mismo han sufrido extorsión y violencia por parte de las autoridades policiales por el hecho de consumir drogas/SPA, algunas han estado privadas de libertad de 1 a 3 veces en los últimos 12 meses.